



# Bebekte Herpes Zoster

## Herpes Zoster in Infant

**Ergin Çiftçi<sup>1</sup>, Anıl Tapırsız, Nurşen Belet, Fatih Günay, Erdal İnce**

<sup>1</sup> Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Ankara, Türkiye



Yedi aylık kız bebek huzursuzluk, ateş ve vücutta döküntü nedeniyle getirildi. Hastanın yakınmaları iki gün önce başlamıştı. Muayenesinde, torakolomber bölgede, orta hattı geçmeyen, grup yapmış papüloveziküler lezyonları vardı. Hastanın çocuk bakım evinde kaldığı sırada daha bir aylıkken suçiçeği geçirdiği öğrenildi. Ancak annesinin suçiçeği geçirip geçirmediği konusunda herhangi bir bilgi elde edilemedi. Hastaya herpes zoster tanısı konuldu. Huzursuzluğu nedeniyle ağrısı olduğu düşünülen hastaya intravenöz asiklovir tedavisi başlandı. İzlemde hastanın ateşi olmadı, huzursuzluğu düzeldi, bütün döküntüleri kurutlanarak sorunsuz olarak iyileşti.

Varisella-zoster virüs, suçiçeği hastalığından sonra dorsal kök ganglionlarında latent olarak kalır. Bağışıklığın zayıfladığı durumlarda virüsün akson boyunca yayılmasıyla innerve edilen dermatomda papüloveziküler döküntü ortaya çıkar. Suçiçeğinin erken yaşta geçirilmesi hastalığa karşı geliştirilen bağışıklığın yetersizliğiyle sonuçlanabilir. Bu çocuklarda herpes zoster daha erken yaşlarda gelişebilir. Hastalık çoğunlukla kendiliğinden düzelebilirse de asiklovir tedavisi lezyonların daha hızlı iyileşmesini sağlar ve çocuklarda nadiren görülen herpes sonrası nevraljiyi önlemede etkilidir.

**Yazışma Adresi / Correspondence Address:**

**Ergin Çiftçi**

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,  
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Ankara-Türkiye

**E-mail:** erginciftci@gmail.com

©Telif Hakkı 2018  
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Derneği -Makale metnine  
www.cocukenfeksiyon.org web sayfasından ulaşılabilir.

©Copyright 2018 by Pediatric  
Infectious Diseases Society -Available online at  
www.cocukenfeksiyon.org